

Уважаемый пациент!

Вам была проведена интравитреальная инъекция.

Для того, чтобы сохранить результаты проведенной операции, Вам следует знать следующее:

После инъекции:

Вам сделали интравитреальную инъекцию в глаз. В течение 30 минут после инъекции Вы будете находиться под наблюдением медицинского персонала клиники.

На следующий день после инъекции Вам необходимо явиться на обязательный осмотр. В течение 10-30 дней после инъекции Вам будут необходимы периодические осмотры по назначению лечащего врача.

Первые 7 дней:

Пользуйтесь только специальными каплями по назначению врача.

Врач-офтальмолог может дать Вам дополнительные рекомендации и назначить время осмотра. В случаях, если потребуется срочная консультация, помощь (травма, внезапное снижение зрения, воспаление глаза и т.п.), Вам необходимо срочно обратиться к лечащему врачу.

Все обследования и консультации в клинике осуществляются по предварительной записи.

Схема закапывания капель после инъекции:

Капли можно закапывать самостоятельно или это могут делать родственники. Вымыв руки с мылом, оттяните вниз нижнее веко оперированного глаза, в образовавшуюся между веком и глазом ложбинку капните 1 каплю лекарства (не дотрагиваться до глаза пипеткой, не прикасаться флаконом к векам и ресницам!). При этом смотреть лучше вверх. Удобно закапывать лекарства, лежа на спине. Перерыв между закапыванием разных лекарств не менее 5-10 минут.

Сигницеф - 1 капля 4 раза в день - 7 дней

Броксинак (Накван) -1 капля 2 раза в день - 7 дней

Схема закапывания может быть назначена врачом индивидуально.

При появлении жалоб на болевые ощущения, светобоязнь, слезотечение, снижение зрения, появление отделяемого из глаз или если получили травму глаза, немедленно обратитесь к врачу нашей клиники (если невозможно, тогда к офтальмологу по месту жительства). В выходные и праздничные дни Вы, также, можете обратиться за помощью, позвонив по телефону:

8(863)310-06-07, 8(800)301-45-95.